

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ



от 18 до 39 лет



от 40 лет



18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет - диспансеризация
19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 лет - профилактический медицинский осмотр

ЕЖЕГОДНО - диспансеризация



АНКЕТИРОВАНИЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФАКТОРОВ РИСКА



ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
РИСКА



ИССЛЕДОВАНИЕ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ
В КРОВИ



РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ



ОСМОТР ЖЕНЩИН
АКУШЕРКОЙ
ИЛИ ВРАЧОМ
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА
В КРОВИ



ИЗМЕРЕНИЕ
ВНУТРИГЛАЗНОГО
ДАВЛЕНИЯ



ОСМОТР НА НАЛИЧИЕ
ВИЗУАЛЬНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ИЗМЕРЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ



РАСЧЕТ
ИНДЕКСА
МАССЫ ТЕЛА



ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ДЛЯ КАЖДОГО ВОЗРАСТА В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5», г.Тюмень, ул. Московский тракт 121/7, тел. +7 (3452) 35-00-45 Тираж 10000 экз., 2022 г.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОМОЖЕТ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК РАЗВИТИЯ:



ИНФАРКТА

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. Например, в 2016 году от ССЗ умерло 17,9 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта*.



ИНСУЛЬТА

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Рак является одной из ведущих причин смерти в мире, которая в 2020 г. унесла жизни почти 10 млн человек, или почти каждого шестого умершего*.



АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

По данным ВОЗ 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у себя заболевания, при этом гипертония — одна из ведущих причин смертности во всем мире.



САХАРНОГО ДИАБЕТА

Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей, а в 2019 г. диабет стал девятой ведущей причиной смерти в мире*.



БОЛЕЗНЕЙ ЛЁГКИХ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – третья причина смерти во всем мире, от которой в 2019 г. умерло 3,23 млн человек*.



ГЛАУКОМЫ

Во всем мире насчитывается не менее 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или слепоты, причем более 1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения*.

* ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Служба
здравоохранения

